

Tomato Sun Dipper F<sub>1</sub>  
(*Solanum lycopersicum*)

Cultura para Plantas Vegetales (revisado 02/12/24)

Información General

| Ubicación               | Estación de Floración        | Altura                     | Extensión                 | Espacio entre Plantas    |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| principios de primavera | finales de primavera, verano | 60-84 plg.<br>(152-213 cm) | 36-48 plg.<br>(91-122 cm) | 18-36 plg.<br>(46-91 cm) |

Germinación

| Tipo de Semilla | Tamaño de plug recomendado | Semillas/celda | Semanas de cultivo de plugs | días desde el 50% hasta la germinación máxima | pH/CE Inicial del sustrato (1:2) | Cubrir semilla   |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| RAW             | 288                        | 1              | 3-4                         | 2-3                                           | 5,5-5,8 pH<br>0,5 mmhos/cm       | Cobertura ligera |

Producción de Plugs

|              | Etapla 1                               | Etapla 2                                | Etapla 3                                | Etapla 4                                |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Humedad      | Nivel 4                                | Nivel 3-4                               | Nivel 2-3                               | Nivel 2-3                               |
| Temperatura  | 70-75°F<br>(21-24°C)                   | 68-72°F<br>(20-22°C)                    | 68-72°F<br>(20-22°C)                    | 65-68°F<br>(18-20°C)                    |
| Luz          | Opcional                               | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 p.c.<br>(26.900-53.800 Lux) |
| Fertilizante | Menos de 100 ppm N<br>(CE menor a 0,7) | Menos de 100 ppm N<br>(CE menor a 0,7)  | Menos de 100 ppm N<br>(CE menor a 0,7)  | Menos de 100 ppm N<br>(CE menor a 0,7)  |

Notas sobre Fertilizante

Los tomates son muy sensibles a las altas concentraciones de sales, particularmente a las altas concentraciones de amonio, durante la germinación. Mantenga los niveles de amonio a menos de 10 ppm.

Recomendaciones Clave para Propagación

La altura se puede controlar limitando el fertilizante, evitando el riego excesivo, cultivando en condiciones de mucha luz y usando DIF cuando sea posible. Si es necesario, se puede aplicar uniconazol (Sumagic) en una proporción de 2,5 a 5 ppm 2 semanas después de la siembra para controlar la altura. Repita 2 semanas después si es necesario.

Producción de Planta Terminada

| Temperatura de Producción                              | pH/CE Objetivo del sustrato (1:2) | Fertilizante | Horas Luz |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|
| (días) 65-70°F (18-21°C)<br>(noches) 62-65°F (17-18°C) | 5,5-6,2 pH<br>0,75-1,0 mmhos/cm   |              | -         |

Días a Fruto Maduro

60-65

## Programación del cultivo

| Tamaño del Recipiente      | Número de Plugs | Tiempo de Cultivo | Estación  | RC |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------|----|
| Pack 306                   | 1 (ppp)         | 2-4 (semanas)     | primavera | -  |
| 4/4,5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp)         | 2-4 (semanas)     | primavera | -  |
| 5/6 plg./Galón             | 1 (ppp)         | 4-6 (semanas)     | primavera | -  |

### Recomendaciones Clave para Terminar

Variedad indeterminada. Se comporta mejor cuando se cultiva en el suelo y con apoyo.

**NOTA:** Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

## Fotos de Variedades



Sun Dipper



Sun Dipper



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2026 Ball Horticultural Company