

Dusty Miller Maritima Silverdust

(Cineraria maritima/Senecio cineraria)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 16/10/25)

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera	finales de primavera, verano, finales de verano, otoño	10 plg. (25 cm)	10 plg. (25 cm)	10-12 plg. (25-30 cm)

Germinación

Tipo de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	días desde el 50% hasta la germinación máxima	pH/CE Inicial del sustrato (1:2)	Cubrir semilla
PEL, RAW	288	1	4-5	3-5	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	No

Producción de Plugs

	Etapas 1	Etapas 2	Etapas 3	Etapas 4
Humedad	Nivel 4	Nivel 4-2	Nivel 3-2	Nivel 3-2
Temperatura	68-77°F (20-25°C)	68-73°F (20-23°C)	65-70°F (18-21°C)	60-62°F (16-17°C)
Luz	Opcional	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux)
Fertilizante		Menos de 100 ppm N (CE menor a 0,7)	100 a 175 ppm N (CE de 0,7 a 1,2)	100 a 175 ppm N (CE de 0,7 a 1,2)
RC	daminozide/2.500-5.000 ppm/espray			

Notas sobre Fertilizante

Una vez que los cotiledones se hayan expandido completamente, fertilice con 50 a 75 ppm de 14-0-14, cada riego de por medio. En la etapa 3, aumente el fertilizante a 100-175 ppm de 20-10-20, alternando con 14-0-14.

Recomendaciones Clave para Propagación

Se recomienda usar un fungicida preventivo contra la Alternaria. Mantenga el follaje lo más seco posible para evitar riesgo de enfermedades.

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	pH/CE Objetivo del sustrato (1:2)	Fertilizante	Horas Luz
(días) 60-65°F (16-18°C) (noches) 55-58°F (13-14°C)	5,5-5,8 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 a 225 ppm N (CE de 1,2 a 1,5)	-

Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
4/4,5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	6-8 (semanas)	primavera	daminozide 5.000 ppm espray
5/6 plg./Galón	3 (ppp)	6-8 (semanas)	primavera	daminozide 5.000 ppm espray

Notas sobre Fertilizante

Fertilice con 175 a 225 ppm de 14-0-14 para aumentar la "pelusa plateada" en las hojas.

Problemas Comunes

Enfermedades: Enfermedades foliares. Utilice medidas preventivas y mantenga el follaje lo más seco posible.

Recomendaciones Clave para Terminar


Los despuntes no se recomiendan. Para controlar la altura, use daminozida según sea necesario.

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

Fotos de Variedades



Silverdust



Silverdust



PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185
+1 800-231-7065 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2026 Ball Horticultural Company