# GrowerFacts

PanAmericanSeed®

## SimplySalad® Summer Picnic Mixture

Cultura para Plantas Vegetales (revisado 15/02/23)

## Información General

| Ubicación | Estación de Floración | Altura | Extensión | Espacio entre Plantas |
|---|---|---|---|---|
| finales de primavera, principios de primavera | - | 12 plg.<br>(30 cm) | 12 plg.<br>(30 cm) | 8-12 plg.<br>(20-30 cm) |

## Germinación

| Tipo de Semilla | Tamaño de plug recomendado | Semillas/celda | Semanas de cultivo de plugs | días desde el 50% hasta la germinación máxima | pH/CE Inicial del sustrato (1:2) | Cubrir semilla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPL | 128 | 1 | 2-3 | 2-3 | 5,8-6,2 pH<br>0,75 mmhos/cm | Cobertura ligera |

## Producción de Plugs

| | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Humedad** | Nivel 4 | Nivel 3-4 | Nivel 2-3 | Nivel 2-3 |
| **Temperatura** | 65-73°F<br>(18-23°C) | 68-70°F<br>(20-21°C) | 65-70°F<br>(18-21°C) | 62-65°F<br>(17-18°C) |
| **Luz** | Opcional | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 p.c.<br>(26.900-53.800 Lux) |
| **Fertilizante** | Menos de 100 ppm N<br>(CE menor a 0,7) | Menos de 100 ppm N<br>(CE menor a 0,7) | 100 a 175 ppm N<br>(CE de 0,7 a 1,2) | 100 a 175 ppm N<br>(CE de 0,7 a 1,2) |

### Recomendaciones Clave para Propagación

El tiempo total del cultivo se puede reducir en 1 semana sembrando directamente al recipiente final.

## Producción de Planta Terminada

| Temperatura de Producción | pH/CE Objectivo del sustrato (1:2) | Fertilizante | Horas Luz |
|---|---|---|---|
| **(días)** 62-70°F (17-21°C)<br>**(noches)** 56-61°F (13-16°C) | 5,8-6,2 pH<br>0,75 mmhos/cm | Menos de 100 ppm N<br>(CE menor a 0,7) | - |

## Programación del cultivo

| Tamaño del Recipiente | Número de Plugs | Tiempo de Cultivo | Estación | RC |
|---|---|---|---|---|
| 4/4,5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp) | 2-4 (semanas) | primavera | - |
| 8 plg./2 Galón | 3-4 (ppp) | 2-4 (semanas) | primavera | - |
| 10 plg. o Canasta colgante/3 Galón | 4-5 (ppp) | 4-6 (semanas) | primavera | - |
| 12 plg. o Canasta colgante/5 Galón | 5-6 (ppp) | 4-6 (semanas) | primavera | - |

### Recomendaciones Clave para Terminar

Se puede sembrar directamente en el recipiente final. Para lograr una producción más rápida con un buen color de follaje, SimplySalad se puede cultivar con temperaturas moderadas a cálidas (55 a 70°F/13 a 21°C) y luego se puede terminar a una temperatura de 45 a 55°F (7 a 13°C) durante 3 a 5 días. Las variedades coloreadas desarrollan pigmentos muy rápidamente a temperaturas más bajas.

**NOTA**: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su region, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

## Fotos de Variedades

Summer Picnic Mixture

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road,West Chicago, Illinois, USA, 60185
**+1 800-231-7065 PanAmSeed.com**

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros paises.
©2026 Ball Horticultural Company