

Pepper (Edible Potted) Hot Lemon Zest

(Capsicum annuum)

Cultura para Plantas Vegetales (revisado 14/10/25)

Información General

| Ubicación               | Estación de Floración | Altura                   | Extensión                | Espacio entre Plantas |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| principios de primavera | verano                | 12-14 plg.<br>(30-36 cm) | 12-14 plg.<br>(30-36 cm) |                       |

Germinación

| Tipo de Semilla | Tamaño de plug recomendado | Semillas/celda | Semanas de cultivo de plugs | días desde el 50% hasta la germinación máxima | pH/CE Inicial del sustrato (1:2) | Cubrir semilla   |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| RAW             | 288                        | 1              | 3-4                         | 5-6                                           | 5,4-5,8 pH<br>0,8-1,2 mmhos/cm   | Cobertura ligera |

Producción de Plugs

|              | Etapas 1                               | Etapas 2                                | Etapas 3                                | Etapas 4                                |
|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Humedad      | Nivel 4                                | Nivel 3-4                               | Nivel 2-4                               | Nivel 2-4                               |
| Temperatura  | 70-73°F<br>(21-23°C)                   | 68-70°F<br>(20-21°C)                    | 68-70°F<br>(20-21°C)                    | 68-70°F<br>(20-21°C)                    |
| Luz          | Opcional                               | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 1.000-2.500 p.c.<br>(10.800-26.900 Lux) | 2.500-5.000 p.c.<br>(26.900-53.800 Lux) |
| Fertilizante | Menos de 100 ppm N<br>(CE menor a 0,7) | 100 a 175 ppm N<br>(CE de 0,7 a 1,2)    | 175 a 225 ppm N<br>(CE de 1,2 a 1,5)    | 175 a 225 ppm N<br>(CE de 1,2 a 1,5)    |
| RC           |                                        |                                         | uniconazole/2,5 ppm/espray              | uniconazole/2,5 ppm/espray              |

Recomendaciones Clave para Propagación

Para garantizar un cultivo uniforme, el regulador de crecimiento debe aplicarse con una fina niebla. Para variedades más vigorosas, una aplicación de uniconazole 2,5 ppm a los 10 a 12 días después de la siembra ayudará a controlar el tamaño de la planta, repetir 2 semanas después si es necesario. Para germinar en mesas: Asegúrese que las bandejas estén mojadas antes de cubrir. Cobertura de las bandejas: primero cubra las bandejas con una tela reemay y después, por encima del reemay, cubra con un plástico blanco. Quite el plástico después de 8 a 10 días. Mantenga la tela de reemay mojada y quítela después de 2 a 3 días más.

Producción de Planta Terminada

| Temperatura de Producción                              | pH/CE Objetivo del sustrato (1:2) | Fertilizante                         | Horas Luz   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| (días) 68-80°F (20-27°C)<br>(noches) 66-70°F (19-21°C) | 5,5-5,9 pH<br>1,8-2,5 mmhos/cm    | Más de 300 ppm N<br>(CE mayor a 2,0) | Día Neutral |

Días a Fruto Verde

85-100

Días a Fruto Maduro

100-115

## Programación del cultivo

| Tamaño del Recipiente | Número de Plugs | Tiempo de Cultivo | Estación  | RC |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------|----|
| 5/6 plg./Galón        | 1 (ppp)         | 17 (semanas)      | primavera | -  |
| 8 plg./2 Galón        | 1 (ppp)         | 17 (semanas)      | primavera | -  |
| 5/6 plg./Galón        | 1 (ppp)         | 15 (semanas)      | verano    | -  |
| 8 plg./2 Galón        | 1 (ppp)         | 15 (semanas)      | verano    | -  |

### Notas sobre Fertilizante

Especialmente cuando las plantas se producen muy secas, es importante usar una CE más alta, aproximadamente una vez por semana, cuando las plantas son regadas por debajo. Asegure que tenga suficiente Ca hacia finales del cultivo.

### Problemas Comunes

La plaga más común para capsicum son los trips. Recomendamos el uso de trampas adhesivas (1 por cada 20 pies/6 m en la mesa o banca).

### Recomendaciones Clave para Terminar

Plante los plantines profundo. Riegue por debajo para mantener seca la superficie del sustrato. Produzca las plantas secas hasta la floración, permitiendo que marchiten ligeramente entre riegos. Para optimizar el crecimiento, separe las plantas cuando comiencen a tocarse unas con otras. Mantenga las plantas secas desde que las separe hasta la floración, para evitar el estiramiento. Debido al peso de los frutos, recomendamos estacas de soporte para estabilizar las plantas durante el transporte.

**NOTA:** Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

## Fotos de Variedades



Hot Lemon Zest



Hot Lemon Zest



PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185  
+1 800-231-7065 [PanAmSeed.com](http://PanAmSeed.com)

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2026 Ball Horticultural Company