

Cuphea Pink Shimmer

(*Cuphea ramosissima*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 23/01/21)

Información General

| Ubicación | Estación de Floración | Altura | Extensión | Espacio entre Plantas |
|---|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| principios de primavera, finales de primavera | principios de primavera, primavera, finales de primavera, verano | 10-16 plg. (25-41 cm) | 12-18 plg. (30-46 cm) | 8-12 plg. (20-30 cm) |

Germinación

| Tipo de Semilla | Tamaño de plug recomendado | Semillas/celda | Semanas de cultivo de plugs | Días para germinar | pH/CE Inicial del sustrato (1:2) | Cubrir semilla |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|
| PMPL | 288 | | 4 | 4-5 | 5,4-5,8 pH 1,5 mmhos/cm | No |

Producción de Plugs

| | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 |
|---------------------|----------------------|---|---|---|
| Humedad | Nivel 4 | Nivel 3-4 | Nivel 2-4 | Nivel 2-4 |
| Temperatura | 72-77°F (22-25°C) | 72-77°F (22-25°C) | 72-77°F (22-25°C) | 72-77°F (22-25°C) |
| Luz | Luz | 10-12 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux) | 10-15 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux) | 10-20 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux) |
| Fertilizante | | Menos de 100 ppm N (CE menor a 0,7) | 100 a 175 ppm N (CE de 0,7 a 1,2) | 100 a 175 ppm N (CE de 0,7 a 1,2) |
| RC | | | daminozida/2.500 ppm/espray paclobutrazol/1 ppm/espray | |

Recomendaciones Clave para Propagación

El uso de reguladores de crecimiento (RC) sólo debe hacerse en la etapa 3. Usar Bonzi a 1 ppm espray en condiciones más cálidas.

Producción de Planta Terminada

| Temperatura de Producción | pH/CE Objetivo del sustrato (1:2) | Fertilizante | Horas Luz |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| (días) 70-75°F (21-24°C) (noches) 65-68°F (18-20°C) | 5,8-6,5 pH 1,2-1,5 mmhos/cm | 175 a 225 ppm N (CE de 1,2 a 1,5) | Día Neutral |

Programación del cultivo

| Tamaño del Recipiente | Número de Plugs | Tiempo de Cultivo | Estación | RC |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| Pack 306 | 1 (ppp) | 5-7 (semanas) | primavera | paclobutrazol 2 ppm espray |
| Pack 306 | 1 (ppp) | 5-7 (semanas) | primavera | paclobutrazol 2 ppm espray |
| 5/6 plg./Galón | 1-3 (ppp) | 6-8 (semanas) | primavera | - |
| 10 plg. o Canasta colgante/3 Galón | 3-4 (ppp) | 9-10 (semanas) | primavera | - |
| 12 plg. o Canasta colgante/5 Galón | 4-5 (ppp) | 10-11 (semanas) | primavera | - |

Notas sobre Fertilizante

Cuphea ramosissima responde a una aplicación de paclobutrazol (espray) a 2 ppm y a una de daminozida (espray) a 5.000 ppm. La dosis baja de paclobutrazol (espray) puede controlar las plantas por mucho más tiempo y prolongar la vida útil. La aplicación de paclobutrazol también hace que el follaje sea un poco más verde oscuro y con tallos más robustos.

Sensibilidad Química

Evite un espray de Florel o la mezcla en tanque con Florel, ya que podría causar fitotoxicidad.

Recomendaciones Clave para Terminar

Aplicar un fungicida en el trasplante. Utilice sustratos con excelente aireación. No crece bien en suelos compactos. No riegue en exceso las plantas. Proporcionar luz alta para evitar el estiramiento. Los niveles bajo de luz reducirán la ramificación.

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

Fotos de Variedades



Pink Shimmer



Pink Shimmer

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2021 Ball Horticultural Company