

Dianthus Serie Corona™ F₁

(*Dianthus chinensis*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 29/11/18)

Crowned with huge flower power

Wow 'em with the biggest blooms of any dianthus of this type...exceptional flower form...and a palette of showstopping colour choices. Corona adds a regal touch to cool-season landscapes, gardens and patio planters.

Plug crop time: 4 to 6 weeks

Transplant to finish: 6 to 8 weeks

- At 2 to 3 in./5 to 8 cm, Corona's blooms are larger than the competition, plus it offers uniform flowering time and habit.
- Produces multiple flowers on a compact, mounded plant.
- Gives its best performance in cool weather, making it great planted along with other cool-season annuals such as pansies.

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera	principios de primavera, primavera, finales de primavera, verano, finales de verano, otoño	8-10 plg. (20-25 cm)	8-10 plg. (20-25 cm)	8-10 plg. (20-25 cm)

Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
PEL	288	1	4-6	3-5	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Sí

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 4	Nivel 3-4	Nivel 2-3	Nivel 2-3
Temperatura	64-68°F (18-20°C)	65-70°F (18-21°C)	60-65°F (16-18°C)	55-60°F (13-16°C)
Luz	Opcional	5-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	8-10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
Fertilizante	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7		100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2
RC	paclobutrazol/5 ppm/espray		paclobutrazol/5 ppm/espray	

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 60-72°F (16-22°C) (noches) 50-60°F (10-16°C)	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	175 a 225 ppm N - CE de 1.2 a 1.5	Día Largo Facultativo

Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Pack 306	1 (ppp)	6-8 (semanas)	finales de primavera	paclobutrazol 10 ppm espray
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	6-8 (semanas)	finales de primavera	paclobutrazol 10 ppm espray

Recomendaciones Clave para Terminar

Crece mejor bajo alta intensidad de luz y noches frescas. En condiciones de DLI bajo, el tiempo total del cultivo se retrasará

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

Fotos de Variedades



Cherry Red



Rose



Strawberry



White



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2019 Ball Horticultural Company