

## Impatiens Serie Dazzler® F<sub>1</sub>

(*Impatiens walleriana*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 24/02/20)

### Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
primavera, principios de primavera	primavera, finales de primavera, verano, finales de verano	9-11 plg. (23-28 cm)	13-15 plg. (33-38 cm)	8-10 plg. (20-25 cm)

### Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
COT	288	1	4-5	3-5	6,0-6,2 pH 0,5-0,75 mmhos/cm	No

### Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
<b>Humedad</b>	Nivel 4-5	Nivel 2-4	Nivel 2-3	Nivel 2-3
<b>Temperatura</b>	72-76°F (22-24° C)	70-72°F (21-22°C)	68-70°F (20-21°C)	62-65°F (17-18°C)
<b>Luz</b>	Opcional	450-700 p.c. (4.800-7.500 Lux)	450-700 p.c. (4.800-7.500 Lux)	450-700 p.c. (4.800-7.500 Lux)
<b>Fertilizante</b>		Menos de 100 ppm N - CE menor a 0,7	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0,7	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0,7

### Recomendaciones Clave para Propagación

No cubra la semilla.

### Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 70-75°F (21-24°C) (noches) 62-68°F (17-20°C)	6,2-6,5 pH 0,75-1,0 mmhos/cm	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0,7	Día Neutral

### Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Pack 306	1 (ppp)	3-4 (semanas)	primavera	-
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	4-5 (semanas)	primavera	-
10 plg. o Canasta colgante/3 Galón	3-5 (ppp)	8-10 (semanas)	primavera	-

### Recomendaciones Clave para Terminar

Las plantas de impacientes muestran respuesta a daminozide, paclobutrazol y uniconazol. El monitoreo del uso de agua y fertilización pueden ayudar a controlar el crecimiento y vigor de las plantas.

**NOTA:** Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

## Fotos de Variedades



Blue Pearl



Bright Eye



Coral



Coral Splash



Cranberry



Deep Orange



Deep Pink



Lilac Splash



Orange



Pink



Punch



Red



Rose




Salmon



Salmon Splash



Scarlet



Violet



Violet Star  
Blend



White



Baby Shower  
Mixture



Grower Select  
Mixture



Merlot Mixture



Mixture



Passionfruit  
Mixture



Tutti Frutti  
Mixture



Voodoo Too  
Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y © indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2020 Ball Horticultural Company