

Petunia (Spreading) Serie Easy

Wave® F₁

(*Petunia x hybrida*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 24/02/20)

Bold and creative!

You'll always stand out in the petunia market with Easy Wave. Bring in a wide array of decorator colours. Put the huge versatility to work – they're perfect for solo and mixed planters and baskets, gardens and landscapes. Best of all, these all-season salesmakers deliver customer-pleasing performance all Summer.

Plug crop time: 4 to 6 weeks

Transplant to finish: Spring 6 to 7 weeks, Summer 4 to 5 weeks

- Exceptional uniformity means simplified production, maximized plug yields and the ability to meet every ship date for every colour. Lets you grow specialty mixes, too!
- More mounded with more controlled spread than Wave® varieties.
- Recommended in Wave branded packaging: 6-in./15-cm pots, premium quarts and gallons, 306 premium packs with handle, hanging baskets.

Información General

| Ubicación | Estación de Floración | Altura | Extensión | Espacio entre Plantas |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| principios de primavera | primavera, finales de primavera, verano, finales de verano | 6-12 plg. (15-30 cm) | 30-39 plg. (76-99 cm) | 10-15 plg. (25-38 cm) |

Germinación

| Forma de Semilla | Tamaño de plug recomendado | Semillas/celda | Semanas de cultivo de plugs | Días para germinar | pH/CE inicial del medio | Cubrir semilla |
|------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| PEL | 288 128 | 1 1 | 4-6 5-7 | 3-5 | 5,5-6,0 pH 0,75 mmhos/cm | No |

Producción de Plugs

| | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 |
|---------------------|-------------------------------------|---|--|--|
| Humedad | Nivel 4-5 | Nivel 3-4 | Nivel 2-4 | Nivel 2-4 |
| Temperatura | 72-75°F (22-24° C) | 68-75°F (20-24°C) | 65-70°F (18-21°C) | 60-65°F (16-18°C) |
| Luz | Opcional | 6 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux) | 8-12 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 2.500-4.000 p.c. (26.900-43.100 Lux) | 8-15 mol·m ⁻² ·d ⁻¹ 2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux) |
| Fertilizante | Menos de 100 ppm N - CE menor a 0,7 | | 100 a 175 ppm N - CE de 0,7 a 1,2 | 100 a 175 ppm N - CE de 0,7 a 1,2 |
| RC | | | daminozide/2.500-5.000 ppm/espray | daminozide/2.500-5.000 ppm/espray |

Producción de Planta Terminada

| Temperatura de Producción | PH/CE del Medio Deseado | Fertilizante | Horas Luz |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| (días) 61-75°F (16-24°C) (noches) 57-65°F (14-18°C) | 5,5-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm | 225 a 300 ppm N - CE de 1,5 a 2,0 | Día Largo Facultativo |

Notas sobre Horas Luz

Requisito mínimo de horas luz por variedad:

9 horas: Rose Fusion; 9,5 horas: Lavender Sky Blue; 10 horas: Berry Velour, Pink Passion, Burgundy Star, Coral Reef, Neon Rose, Rosy Dawn, Silver, Violet, White, Yellow; 10.5 horas: Blue, Burgundy Velour; 11 horas: Pink, Plum Vein, Red, Red Velour

Programación del cultivo

| Tamaño del Recipiente | Número de Plugs | Tiempo de Cultivo | Estación | RC |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------------------|
| Pack 306 | 1 (ppp) | 6-7 (semanas) | primavera | paclobutrazol 3-5 ppm empape |
| 4/4.5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp) | 6-7 (semanas) | primavera | paclobutrazol 3-5 ppm empape |
| 10 plg. o Canasta colgante/3 Galón | 3-4 (ppp) | 8-9 (semanas) | primavera | paclobutrazol 3-5 ppm empape |
| Pack 306 | 1 (ppp) | 4-5 (semanas) | verano | paclobutrazol 3-5 ppm empape |
| 4/4.5 plg./Cuarto de galón | 1 (ppp) | 4-5 (semanas) | verano | paclobutrazol 3-5 ppm empape |
| 10 plg. o Canasta colgante/3 Galón | 3-4 (ppp) | 6-7 (semanas) | verano | paclobutrazol 3-5 ppm empape |

Problemas Comunes

Insectos: Trips, Áfidos, moscas de invernaderos (fungus gnat y shore flies). Enfermedades: podredumbre gris (botrytis), Rhizoctonia, Pythium.

Recomendaciones Clave para Terminar

Daminozida espray a 3.500 a 5.000 ppm de 7 a 10 días después del trasplante promueve la ramificación y controla el estiramiento temprano. Como tratamiento opcional, se puede usar flurprimidol (Topflor) en lugar de paclobutrazol a 2/3 de la dosis de paclobutrazol. Se puede cultivar a temperaturas tan bajas como 50°F (10°C). El tiempo del cultivo está relacionado con la temperatura promedio cuando se cultiva bajo la longitud de día adecuada. Las plantas tardarán más en florecer cuando crezcan en condiciones más frías. El rango de ILD recomendado es de 12 a 20 mol · m⁻² · d⁻¹. Burgundy Velour, Plum Vein y Red Velour son más vigorosas dentro del grupo Easy Wave. Pueden tomar dosis más altas de paclobutrazol, 1 a 2 ppm más. Variedades duraderas en frío: Berry Velour, Blue, Burgundy Star, Burgundy Velour, Coral Reef, Lavender Sky Blue, Neon Rose, Pink Passion, Pink, Plum Vein, Red, Red Velour, Rose Fusion, Silver, Violet, White, Yellow Variedad sensible al frío : Rosy Dawn

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

Fotos de Variedades



Berry Velour



Blue



Burgundy Star



Burgundy
Velour



Coral Reef



Lavender Sky
Blue



Neon Rose




Pink



Pink Passion



Plum Vein




Red



Red Velour



Rose Fusion



Rosy Dawn



Silver



Violet



White



Yellow




Beachcomber
Mixture
Improved



Formula
Mixture



Great Lakes
Mixture



Opposites
Attract Mixture



Plum Pudding
Mixture



South Beach
Mixture



Starfish Mixture



The Flag
Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2020 Ball Horticultural Company