

Viola Serie Quicktime™ F₁

(*Viola cornuta*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 23/10/18)

Shorter production time = cost savings

Flowering two weeks faster than comparable series, Quicktime allows you to sow your viola crop two weeks later and still ship on time in Spring. With reduced labour and less heat needed in the greenhouse, the cost savings are quick to add up!

Plug crop time: 4.5 to 5 weeks

Transplant to finish: Spring 5 to 6 weeks, Autumn 3 to 4 weeks

- Early-blooming, free-flowering plants provide bright colour in early Spring and Autumn gardens.
- Reduced daylength sensitivity and free-flowering selection criteria make Quicktime viola the best option for saving growing time in cold-grown, overwinter-produced viola crops.
- Compact plants have a uniform habit and are covered in 1 to 1.5-in./3 to 4-cm blooms.
- A well-branched, full-bodied plant that fills out the pot or pack.
- Features 'Hyperflora' flowering power, so it has multiple blooms at first flower and continues with fast secondary and tertiary flowering.

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
finales de primavera, principios de primavera	principios de primavera, primavera, finales de primavera, verano, finales de verano, otoño, invierno	6-8 plg. (15-20 cm)	6-8 plg. (15-20 cm)	6 plg. (15 cm)

Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
PRM	288	1	5	3-4	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Sí

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 4	Nivel 3-4	Nivel 3-4	Nivel 2-4
Temperatura	65-70°F (18-21°C)	60-70°F (16-21°C)	60-65°F (16-18°C)	55-60°F (13-16°C)
Luz	Opcional	2.500 p.c. (26.900 Lux)	2.500 p.c. (26.900 Lux)	5.000 p.c. (53.800 Lux)
Fertilizante	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7		100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2
RC			ancymidol/5-10 ppm/espray daminozide/1.500-2.500 ppm/espray	ancymidol/5-10 ppm/espray daminozide/1.500-2.500 ppm/espray

Recomendaciones Clave para Propagación

Ajuste las dosis de reguladores del crecimiento y la frecuencia de aplicación según las condiciones locales en las etapas 3 y 4.

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 60°F (16°C) (noches) 50-55°F (10-13°C)		100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	Día Largo Facultativo

Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Pack 306	1 (ppp)	5-6 (semanas)	principios de primavera	daminozide 1.500-2.500 ppm espray
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	5-6 (semanas)	principios de primavera	daminozide 1.500-2.500 ppm espray
5/6 plg./Galón	3 (ppp)	5-6 (semanas)	principios de primavera	daminozide 1.500-2.500 ppm espray

Recomendaciones Clave para Terminar

Bajo condiciones de crecimiento invernal, donde las temperaturas nocturnas están justo por encima del punto de congelación (protección contra heladas), las variedades Quicktime serán hasta 2 semanas más rápidas para terminar en producción que Sorbet XP.

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

Fotos de Variedades



Beaconsfield



Blue



Blue Purple
Jump Up



Lemon Jump
Up



Mickey



White Blotch



Yellow Blue
Jump Up



Yellow Violet
Jump Up

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2019 Ball Horticultural Company