

## Zinnia Serie Double Zahara™

(Zinnia marylandica)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 20/02/18)

**Plug crop time:** 3 weeks

**Transplant to finish:** Spring 8 to 9 weeks, Summer 5 to 6 weeks

- The only fully double, disease-resistant zinnia series makes a huge colour show!
- The competition has smaller, semi-double flowers.
- Award-winning, all-season performance and durability in landscapes and containers, especially in sunny, hot and dry conditions.
- Intermediate size is perfect for mid-level plantings in the landscape. Works well in containers, too.

### Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera	primavera, finales de primavera, verano, finales de verano, otoño	16-20 plg. (41-51 cm)	16-20 plg. (41-51 cm)	8-10 plg. (20-25 cm)

### Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
COT, RAW	288	1	3	2-3	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Sí

### Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
<b>Humedad</b>	Nivel 4	Nivel 3-4	Nivel 3-4	Nivel 3
<b>Temperatura</b>	68-73°F 20-23°C	68-76°F 20-24°C	68-76°F 20-24°C	65-70°F 18-21°C
<b>Luz</b>	Opcional	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux)
<b>Fertilizante</b>	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7		100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2
<b>RC</b>	daminozide/1.250-2.500 ppm/espray			

### Recomendaciones Clave para Propagación

Evite humedad excesiva en las plantas y flores. Monitoree para detectar Botrytis.

### Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 65-70°F/18-21°C (noches) 59-64°F/15-18°C	5,5-6,0 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 a 225 ppm N - CE de 1.2 a 1.5	Día Corto Facultativo

### Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	8-9 (semanas)	primavera	daminozide 3.500-5.000 ppm espray
5/6 plg./Galón	3 (ppp)	8-9 (semanas)	primavera	daminozide 3.500-5.000 ppm espray
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	5-6 (semanas)	verano	daminozide 3.500-5.000 ppm espray
5/6 plg./Galón	3 (ppp)	5-6 (semanas)	verano	daminozide 3.500-5.000 ppm espray

## Notas sobre Fertilizante

Evite estrés por fertilización/nutrición, ya que puede causar que las plantas sean menos dobles.

## Problemas Comunes

Insectos: Monitoree para detectar áfidos a principios de la producción, y Thrips durante la floración. Enfermedades: Evite la humedad elevada y condensación en los invernaderos, ya que estas condiciones son favorables para el desarrollo de la Botrytis y el Mildew Polvoriento.

## Recomendaciones Clave para Terminar

Cuando se producen bajo condiciones de luz alta, las flores son más dobles y con colores más intensos. Evite la humedad excesiva en las plantas y flores. Monitoree para detectar la botrytis.

**NOTA:** Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

## Fotos de Variedades

---



Bright Orange




Cherry



Fire



Raspberry  
Ripple



Salmon



White



Yellow  
Improved



Brilliant Mixture



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2019 Ball Horticultural Company