

Calibrachoa Serie Kabloom™ F₁

(*Calibrachoa x hybrida*)

Cultura para Plantas Anuales (revisado 24/02/20)

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera	principios de primavera, primavera, finales de primavera, verano, finales de verano	8-12 plg. (20-30 cm)	10-14 plg. (25-36 cm)	8-12 plg. (20-30 cm)

Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
PMPL	288 128	1 1	5-6 7-8	5-7	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Opcional

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 2-4	Nivel 2-4
Temperatura	72-75°F (22-24°C)	68-70°F (20-21°C)	64-68°F (18-20°C)	55-64°F (13-18°C)
Luz	Opcional	10-12 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	10-15 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	10-20 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
Fertilizante	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0,7		Menos de 100 ppm N - CE menor a 0,7	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0,7
RC	daminozide/2.000-2.500 ppm/espray paclobutrazol/2-3 ppm/espray		daminozide/2.000-2.500 ppm/espray paclobutrazol/2-3 ppm/espray	daminozide/2.000-2.500 ppm/espray paclobutrazol/2-3 ppm/espray

Recomendaciones Clave para Propagación

Se recomienda despuntar para maceteros pequeños y condiciones de IDL bajos. Despunte dejando al menos 4 yemas.

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 64-75°F (18-24°C) (noches) 55-64°F (13-18°C)	5,5-5,8 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	225 a 300 ppm N - CE de 1,5 a 2,0	Día Largo Obligado

Notas sobre Horas Luz

10 horas para Kabloom Yellow; 10.5 horas para Kabloom White Imp., Kabloom Orange y Kabloom Blue; 11 horas para Kabloom Denim, Kabloom Pink, Kabloom Cherry y Kabloom Coral; 11.5 horas para Kabloom Light Pink Blast. Objetivo es IDL de 10 a 25 moles·m⁻²·d⁻¹.

Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	7-8 (semanas)	primavera	flurprimidol 1-2 ppm empape
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	7-8 (semanas)	primavera	paclobutrazol 1-3 ppm empape
10 plg. o Canasta colgante/3 Galón	3 (ppp)	9-11 (semanas)	primavera	flurprimidol 2-3 ppm empape
10 plg. o Canasta colgante/3 Galón	3 (ppp)	9-11 (semanas)	primavera	paclobutrazol 2-3 ppm empape
10 plg. o Canasta colgante/3 Galón	3 (ppp)	5-6 (semanas)	verano	flurprimidol 2-3 ppm empape
10 plg. o Canasta colgante/3 Galón	3 (ppp)	5-6 (semanas)	verano	paclobutrazol 2-3 ppm empape

Notas sobre Fertilizante


Calibrachoa requiere mucho fertilizante. El hierro se puede agregar según sea necesario.

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.


Fotos de Variedades



Blue



Cherry




Coral




Denim



Light Pink Blast




Orange



Pink



White



Yellow

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2020 Ball Horticultural Company