

## Arabis Spring Charm

(*Arabis blepharophylla*)

Cultura para Plantas Perennes (revisado 28/10/19)

**Plug crop time:** 6 to 8 weeks

**Transplant to finish:** 24 to 36 weeks

- Wintergreen, bushy and compact plant has spikes of strong pink flowers over attractive foliage.

### Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
finales de primavera	primavera, finales de primavera	6-8 plg. (15-20 cm)	8 plg. (20 cm)	18-24 plg. (46-61 cm)

### Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
RAW	288	4	6-8	3-6	5,5-6,5 pH 0,75 mmhos/cm	No

### Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
<b>Humedad</b>	Nivel 4	Nivel 3-4	Nivel 2-3	Nivel 2
<b>Temperatura</b>	68-72°F (20-22°C)	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)
<b>Luz</b>	Opcional	2.500 p.c. (26.900 Lux)	2.500 p.c. (26.900 Lux)	5.000 p.c. (53.800 Lux)

#### Fertilizante

#### Vernalización

Sí - Duración de 8 a 10 semanas a partir de 7 a 8 hojas verdaderas en Adelante.

#### Juventud

Comience tratamiento con frío a partir de 7 a 8 hojas verdaderas en Adelante.

### Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 60-65°F (16-18°C) (noches) 50-54°F (10-12°C)	5,5-6,5 pH 1,0-1,3 mmhos/cm	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	Día Neutral

### Programación del cultivo

Tipo de Cultivo	Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Cultivo con hibernación	5/6 plg./Galón	1 (ppp)	28-34 (semanas)	principios de primavera	-

#### Problemas Comunes

Revise para detectar mildew polvoriento, sclerotinia, áfidos, larvas minadoras, Sciara y ácaros.

## Estrategia para Abultar

Abultar hasta 7 a 8 hojas verdaderas.

## Recomendaciones Clave para Terminar

Sustrato bien drenado. No tolera bien inviernos muy húmedos. Fertilización moderada.

**NOTA:** Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

## Fotos de Variedades

---



Spring Charm



Spring Charm

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.  
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698  
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.  
©2020 Ball Horticultural Company