

Strawberry Fresca

(*Fragaria x ananassa*)

Cultura para Plantas Vegetales (revisado 24/02/19)

Days from transplant to ripe fruit: 85

- Produces medium-sized berries from the start of Summer through Autumn.
- Best in baskets, containers and in-ground.

Información General

Ubicación	Estación de Floración	Altura	Extensión	Espacio entre Plantas
principios de primavera	primavera, finales de primavera	3-4 plg. (8-10 cm)	10-12 plg. (25-30 cm)	10-14 plg. (25-36 cm)

Germinación

Forma de Semilla	Tamaño de plug recomendado	Semillas/celda	Semanas de cultivo de plugs	Días para germinar	pH/CE inicial del medio	Cubrir semilla
RAW	288	1-2	4-5	7-14	5,5-5,8 pH 0,75 mmhos/cm	Cobertura ligera

Producción de Plugs

	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4
Humedad	Nivel 3	Nivel 2-3	Nivel 2-3	Nivel 2-3
Temperatura	68-70°F 20-21°C	68-70°F 20-21°C	65-68°F 18-20°C	60-62°F 16-17°C
Luz	Luz	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 p.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 p.c. (26.900-53.800 Lux)
Fertilizante	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7	Menos de 100 ppm N - CE menor a 0.7

Notas sobre Fertilizante

Las fresas son sensibles a los niveles altos de sales, especialmente durante la germinación.

Recomendaciones Clave para Propagación

Las fresas son susceptibles al mildew. Utilice DIF, cuando sea posible, especialmente las 2 primeras horas después del amanecer, para controlar la altura de la planta.

Producción de Planta Terminada

Temperatura de Producción	PH/CE del Medio Deseado	Fertilizante	Horas Luz
(días) 60-65°F 16-18°C (noches) 60-62°F 16-17°C	6,5-7,5 pH 1,0 mmhos/cm	100 a 175 ppm N - CE de 0.7 a 1.2	-

Programación del cultivo

Tamaño del Recipiente	Número de Plugs	Tiempo de Cultivo	Estación	RC
Pack 306	1 (ppp)	6-8 (semanas)	primavera	-
4/4.5 plg./Cuarto de galón	1 (ppp)	8-10 (semanas)	primavera	-
8 plg./2 Galón	3-4 (ppp)	10-12 (semanas)	primavera	-

Notas sobre Fertilizante

Las fresas son sensibles a los niveles altos de sales.

Recomendaciones Clave para Terminar

Susceptible al mildew.

NOTA: Los productores deben usar la información presentada aquí como pautas solamente. PanAmerican Seed recomienda que los productores realicen una prueba de productos en sus propias condiciones. Los tiempos de cosecha variarán según el clima, la ubicación, la época del año y las condiciones ambientales del invernadero. Es responsabilidad del productor confirmar que el tratamiento esté disponible en su región, así como leer y seguir todas las instrucciones de la etiqueta actual relacionadas con los productos. Nada en este documento se considerará como garantía o garantía por parte de PanAmerican Seed de los productos que se enumeran en este documento. Los términos y condiciones de venta de PanAmerican Seed se aplicarán a todos los productos enumerados en este documento.

Fotos de Variedades



Fresca

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ indica marca registrada de y ® indica marca registrada de Ball Horticultural Company en los E.U.A. También puede haber sido registrada en otros países.
©2019 Ball Horticultural Company